

UNIVERSITA' di CATANIA
DIPARTIMENTO di CHIRURGIA
U.O. di CLINICA CHIRURGICA
Direttore Prof. Salvatore Berretta

Fattori prognostici nel cancro tiroideo nell'anziano

XIX Congresso Soc. Italiana Chir. Geriatrica
14-16 Settembre 2006

Tumori maligni della tiroide

1. Carcinomi derivati da epitelio follicolare
 - Ben differenziati (ca. papillare, ca. follicolare)
 - Poco differenziati (ca. insulare, ca. anaplastico)
2. Carcinomi derivati da c-cellule
3. Tumori non epiteliali
4. Tumori secondari

Tumori maligni della tiroide in età geriatrica

Nell'anziano in linea di massima sono presenti gli oncotopi più aggressivi :

- ca. anaplastico, ca. insulare, sarcomi e lifomi;
- inoltre ca. follicolare, ca. a cellule di Hurtle o ad oncotipo misto

FATTORE ETA'

La prognosi dei tumori maligni della tiroide è età-correlata:

- in età geriatrica istotipi più aggressivi
- diagnosi tardiva (bassa percentuale di casi diagnosticati in stadio I-II; generalmente con estensione extracapsulare e/o con metastasi a distanza)
- a parità di stadio, la prognosi è peggiore nell'anziano

FATTORE ETA'

In rapporto all'età, la sopravvivenza a 5 aa. dei tumori maligni della tiroide è la seguente:

• > 50 aa. 50-70%

• < 45 aa. 96%

SESSO DEL PAZIENTE

In rapporto al sesso la sopravvivenza a 20 aa. dei tumori maligni della tiroide è la seguente:

M	85%
---	-----


F	89%
---	-----

Catania: il castello di Federico II di Svevia





Catania: il sole che sorge dal mare



Vulcano Etna in Inverno